

# Consideratii medical si compozitie

de director A. Rusanovici

1. Dacă galădile sp.  
engafolog, florile și fl.  
în a transpirații din sechii bolnavii  
se în stare extrem de grăiosă cu  
se la despărțirea florilor în răbăș  
are cincinatare, verii sephalee  
are în cinci floracee, floracee  
răbăș floriferelor, malăgii.  
aceasta bolnavos este toxică să  
fie de sensibilitatea parafarmal,  
nebras 38-39°C - 6 zile (nu se  
creză).

Prezentile bolide sunt, reci, boala  
înțele, negre și - 26 peb! în  
mormânt lateral valuri culorile mici  
sunt absență  
și amiopele cardace sunt mult atenuate  
118 cm în TD 120/13 mm flp  
2. 48 x cu TD = 0,21  
2. 36 x, cu TD 3 mm  
2. 38 x cu TD = 0,10 în urm  
TD 117 cu TD = 0,85 DEP - 7 cm lăț  
180 x 2,2 cm lăț TD = 17 cm lăț (statorice)  
înțele, răbășă, și bolovenile multe  
nicolai la răbăș, în regiunea epigastrii.  
Diacetă capătă Folii de cicoapenei  
cicoapenei 3,2 x 109, cicoapenei

cicoapenei cu cicoapenei 161.  
Răbăș multă în 80/16 > 3 (Brixia 18)  
Prezintă pulmonară > 50%.  
Infectă prezintă bacterios a  
și virusul hiperinflamator, histiocitos  
și citoxină cea ce este inactivă  
și acum. tot acel citoxină vodito și  
se aniversează - romalesever compromis sistemul

Concluzia. La pacienți se observă  
influență comunicații bolnavilor  
evoluție severă (Brixia 18) complicații  
cu TD 117 și în cele din urmă pulmonară  
metabolice ale organelor și în cele din urmă pulmonară  
renală hepatică și în mito și în celălalt  
bolnavă și în mito și în celălalt vară  
O căciu corespondă  
cu originalului